

# 萌髮<sup>®</sup> 生髮液 5%

Fresh Up Topical Solution 5%  
衛署藥製字第050767號

加強型外用毛髮再生劑，更快更有效解決落髮問題

## ■成分

有效成分及含量：每ml含Minoxidil 50 mg

其他成分(賦形劑)：Alcohol 95%，Propylene Glycol, Citric Acid, Purified Water.

## ■用途(適應症)

雄激素性禿髮

## ■產品特性

- ※針對因為男性荷爾蒙引起的落髮或禿髮，局部使用時，本藥可刺激毛髮生長。
- ※本藥開始作用時間及生長程度因人而異。根據文獻記載，如果要明顯看到刺激毛髮生長之作用，建議依照指示持續使用4個月以上。
- ※曾有案例，在停止使用本藥後3~4個月後，恢復治療前的樣子。
- ※本藥局部使用，僅有微量(0.3~4.5%)會進入全身循環。停止使用本藥4天後，約95%的藥量會從體內排除。
- ※本藥為澄清、無色至淺色之液體，顏色不影響藥效。

## ■使用上注意事項

- ※有下列情形者，請勿使用：
  - 孕婦及授乳婦。
  - 對本藥成分過敏者。
- ※有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - 心臟疾病患者。
  - 18歲以下的人。
  - 65歲以上的人。
- ※有下列情形者，使用前請洽醫師藥師藥劑生：
  - 正在使用心血管用藥或未梢血管擴張劑的人。
  - 正在使用其他藥品的人(包含非處方藥品)。
- ※其他使用上注意事項：
  - 本藥要放在兒童拿不到的地方。
  - 本藥只能外用，不可口服，誤食可能會產生全身性的副作用。
  - 本藥除了頭皮，不適合用於身體其他部位。
  - 如果不小心接觸到較易敏感的部位(例如：眼睛或傷口)，應用大量的冷水清洗。

## ■用法用量

用法	使用時，毛髮及頭皮須完全乾燥。由需要使用的部位為中心，開始使用於頭皮。
用量	每天使用兩次，每次使用1ml，每天不可超過2ml。

塗抹方法：

- ①打開大外蓋，轉開小內蓋，並予丟棄。(如圖示)



↑ 打開大外蓋，  
轉開小內蓋，丟棄。

- ②將溶液吸入滴管中，直到刻度1ml的地方，緩慢均勻施用於禿髮部位，再以指腹稍加按摩。分六次將標準量1ml使用完畢。



溶液剩餘不多時，請傾斜瓶身使用，以利滴管容易吸取。

- ③使用時勿將滴管口朝上，以維持滴管之耐用度。
- ④用畢請將滴管插於瓶上控緊，並蓋上大外蓋。

## ■警語

※服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

部位	症狀
皮膚	發紅、脫皮、灼熱感、起疹子
神經系統	頭痛、頭暈
其他	局部水腫、呼吸急促

- ※服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治。  
嚴重的皮膚發炎(紅腫、疼痛)、心臟不舒服、心跳加快或是血壓變化。
- ※除了輕微皮膚變化之外，前述副作用與使用本藥之因果關係，並未確立。  
經過實驗顯示，使用5%的產品相較於2%，較易發生皮膚的不適症狀。

■包裝：4000毫升以下塑膠瓶裝

■類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

■保存方式：避光儲存於25°C以下，請注意外盒之有效期限。

製造廠：正和製藥股份有限公司新營廠  
廠址：台南市新營區新工路23號(新營工業區)  
經銷商：耐斯企業股份有限公司  
地址：台灣嘉義縣民雄工業區中山路21號  
網址：<http://www.freshup.com.tw>  
諮詢專線：0800-211-226