

萌髮[®] 抗屑洗髮精

Anti-Dandruff Shampoo
康力諾2% 2%(Ketoconazole)

僅供外用

萌髮[®]康力諾2%抗屑洗髮精含ketoconazole，能輔助黴菌感染所引起頭皮屑之治療並預防脂漏性皮膚炎與汗斑等因皮膚芽孢菌過度繁殖所引起的感染症狀。本洗髮精含2%的ketoconazole。

【成份】

每一公克含有20毫克有效抗黴菌成份ketoconazole。

賦形劑：Sodium Laureth Sulfate、Lauramidopropyl Betaine、Eдетate Disodium、Polyquaternium-10、Methyl Parahydroxybenzoate、Propyl Parahydroxybenzoate、Citric Acid、Cocamide Diethanolamine、2-Phenoxyethanol、Methylisothiazolinone、Polyquaternium-7、Fragrance、CI 17200、Purified Water

【性質】

藥效學

Ketoconazole是合成性imidazole dioxolane 衍生物，具有強效的抗黴菌作用，能對抗皮癬菌(dermatophytes)，如髮癬菌屬(Trichophyton spp.)、表皮癬菌屬(Epidermophyton spp.)、小芽孢菌屬(Microsporium spp.)和酵母菌(yeasts)，如念珠菌(Candida spp.)、糠秕疹小芽孢菌(Malassezia spp.)、皮屑芽孢菌(Pityrosporum ovals)。

萌髮[®]康力諾2%抗屑洗髮精可以緩解因上述感染所引起的頭屑剝落。

藥物動力學

若使用Ketoconazole洗髮精於頭皮，幾乎不會經皮膚吸收，即使是長期使用，仍測不到Ketoconazole的血中濃度，因此不會發生全身性作用。若使用Ketoconazole洗髮精於頭皮以外的皮膚，仍可測得Ketoconazole的血中濃度。

臨床前安全性試驗

根據臨床前安全性試驗的研究結果顯示，Ketoconazole洗髮精可能會造成的影響包括急性口腔或皮膚不良反應、眼部刺激及重覆劑量下的皮膚刺激及不良反應。

【適應症】

減少因黴菌感染所引起的頭皮屑治療之輔助劑，汗斑及脂漏性皮膚炎之輔助劑。

【用法與用量】

使用於皮膚或頭皮的感染部位，按摩三至五分鐘後再以清水洗淨。

治療 頭皮屑與脂漏性皮膚炎：每週使用兩次，持續使用二到四週。

汗斑：每天使用一次，持續使用五天。

預防 頭皮屑與脂漏性皮膚炎：每一或二週使用一次。

汗斑：在夏季開始前，每天使用一次，連續使用三天。

【簡單抗屑三步驟】

- 清潔：取適量的洗髮精於手掌中，依正常洗髮程序輕柔清洗頭髮，並用指腹按摩頭皮。
- 停留：洗髮時，讓洗髮精停留在頭皮上3分鐘(可視情況嚴重程度延至15分鐘)。
- 沖淨：以清水徹底沖洗乾淨。

【懷孕及授乳】

Ketoconazole 2%在局部使用後不會經由皮膚吸收。若使用Ketoconazole 2%洗髮精於頭皮以外的全身皮膚，仍可測得Ketoconazole的血中濃度。雖然目前沒有使用於懷孕及授乳婦女的臨床試驗能佐證Ketoconazole的安全性，但至今並無孕婦或哺乳婦女使用Ketoconazole 2%洗髮精後，發生任何相關風險問題的個案情況。若仍有疑問，請諮詢您的藥師或專科醫師。

【禁忌症】

已知對Ketoconazole過敏及其它任何成份過敏的患者不要使用。

【副作用】

依文獻指出，並無最常見的副作用(≥1%)，常見的副作用(<1%)包括眼睛部位異常反應(眼睛刺激敏感、淚水增多)、使用部位異常反應(紅斑、刺激敏感、過敏、搔癢、局部反應)、皮膚或皮下組織異常反應(面皰、禿頭、接觸性皮膚炎、皮膚乾燥、皮膚灼熱感、皮膚不適、脫皮、髮質變化、紅疹)、免疫系統的疾病(過敏症)、感染(毛囊炎)及味覺改變。根據產品上市後安全監測的結果顯示，僅有十分罕見的副作用發生，包括血管性水腫、蕁麻疹與髮色改變。

【過量使用】

若意外吞食時，請就醫。為了避免吸入，請勿催吐或洗胃。

【警語注意事項】

- 長期使用腎上腺皮脂類固醇治療的患者，為了預防停藥後的反彈作用，建議採漸進式的停藥方式。
 - 在開始使用萌髮[®]康力諾2%抗屑洗髮精的第一個星期，繼續使用原有腎上腺皮脂類固醇藥物；
 - 接下來的第二至三個星期，再逐漸減少使用原有的腎上腺皮脂類固醇藥物的次數；
 - 最後完全停止使用原有的腎上腺皮脂類固醇藥物。
- 須置放於兒童無法拿取之處。
- 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦女不建議自行使用。
- 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 塗抹皮膚外用藥後，應徹底洗淨雙手再戴隱形眼鏡。
- 深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。
- 如同其他洗髮精一樣，要避免接觸到眼睛。若洗髮精流入眼中，請以清水沖洗眼睛。

【容量】

4000公克以下塑膠軟管裝、塑膠容器裝、鋁箔盒裝

【儲存方式】

請旋緊瓶蓋並保存於25°C以下，並避免陽光照射處。請置於兒童無法拿取之處。

製造批號、有效期限請參考外盒或瓶身

本註冊商標由耐斯企業股份有限公司授權 正和製藥股份有限公司新營廠製造
衛署藥製字第038560號

藥商、製造商：正和製藥股份有限公司新營廠

住址：台南市新營區新工路23號

經銷商：耐斯企業股份有限公司

地址：台灣嘉義縣民雄工業區中山路21號

網址：<http://www.freshup.com.tw>

消費者服務專線：0800-211-226

醫師藥師藥劑生指示藥品